

Oparzenie III stopnia 60% powierzchni ciała u 6-letniego chłopca - walka o życie oraz wieloletnie leczenie z zakresu chirurgii plastycznej w celu poprawy jego jakości

Ewa Matuszczak, Małgorzata Kowalska

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

6-letni chłopiec został przyjęty w stanie ciężkim do OIT z powodu oparzenia III st. płomieniem 60% pow. ciała



We wczesnym okresie leczenie chirurgiczne (escharotomia w 2 dobie, nekrektomia i przeszczepy skóry) pozwoliło na uratowanie życia chłopca



Poprawa jakości życia chłopca wymagała długotrwałego leczenia chirurgicznego i rehabilitacji. Przez wiele lat konieczne były zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej w celu korekcji blizn i przywrócenia funkcji i estetyki ciała.



Rok po oparzeniu 2 lata po oparzeniu 3 lata po oparzeniu 2 lata po oparzeniu

Dziecko po ciężkim oparzeniu wymaga kompleksowej rehabilitacji, laseroterapii i zabiegów chirurgicznych, które umożliwiają powrót do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.



Wieloletnie leczenie i rehabilitacja mogą być trudnym i wymagającym procesem dla małego pacjenta i jego rodziny. Ważne jest, aby rodzice otrzymali odpowiednie wsparcie psychologiczne i informacyjne, aby mogli pomóc swojemu dziecku w powrocie do zdrowia